



Avertissements agricoles

BRETAGNE

DIRECTION RÉGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT
SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

280, rue de Fougères, 35700 RENNES ☎ 99 36 01 74

BULLETIN TECHNIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES



Publication périodique

ÉDITION : CULTURES MARAÎCHÈRES, LÉGUMIÈRES ET POMMES DE TERRE

BULLETIN N° 145

11 juin 1987

POMMES DE TERRE :

- . Conditions très favorables au Mildiou
- . La lutte contre le doryphore est obligatoire

PEPINIÈRES DE CHOUX : Produire des plants sains

TOMATES D'AUTOMNE : Bon état sanitaire de la serre et des jeunes plants

TOUTES CULTURES DE SERRE : Attention aux maladies

MILДИОU DE LA POMME DE TERRE

Les pluies de ces derniers jours ont été très favorables à la maladie. Elles ont également entraîné le lessivage des fongicides pénétrants ou de contact.

POMMES DE TERRE DE PRIMEUR

Les cultures ont présenté jusqu'ici un bon état sanitaire. Les conditions actuelles risquent toutefois d'entraîner une dégradation de la situation. Il est indispensable de protéger les cultures à récolter dans plus de 15 jours.

Traitez :

- . Immédiatement si la dernière application a été faite avec un produit pénétrant ou de contact.
- . 10 jours après la dernière application si celle-ci a été faite avec un produit systémique et que l'on utilise un produit pénétrant ou de contact.

. 14 jours après la dernière application si celle-ci a été faite avec un produit systémique et que l'on utilise à nouveau un produit systémique (récolte dans plus de trois semaines).

Sur les parcelles récoltées avant le 30 juin utilisez de préférence un produit à base de cuivre (5000 g de cuivre métal par hectare).

POMMES DE TERRE DE SEMENCE ET DE CONSERVATION

La maladie n'a pas encore été détectée en culture mais les conditions actuelles devraient entraîner son apparition dans les prochains jours sur les parcelles insuffisamment protégées.

Intervenez dès le stade 20 cm avec un fongicide de contact. Sur les cultures ayant dépassé ce stade, traitez avec les fongicides et dans les délais indiqués ci-dessus pour les primeurs.

P. 14

DORYPHORES

Des insectes sont observés dans le Finistère et en Ile-et-Vilaine.

Surveillez vos cultures : en présence d'adultes ou de larves, **le traitement est obligatoire.**

PEPINIERES DE CHOUX

MALADIES

Les pluies de ces derniers jours sont favorables au développement du Mildiou et de la fonte des semis.

Traitez dès la levée contre le Mildiou et l'Alternaria, en associant Dithane ou Sandozèbe avec Rovral ou Kidan. Renouvelez ce traitement tous les 7 jours jusqu'au stade 1 feuille vraie, tous les 14 jours au-delà.

En cas de fonte des semis, appliquez dès la levée 2 000 g/ha de thirame en mouillant abondamment. Renouvelez ce traitement tous les 5 à 7 jours.

INSECTES

Un traitement en végétation complémentai-

re du traitement de sol, est conseillé contre la mouche du chou au stade 2 à 3 feuilles vraies. Utilisez Birlane CE 40 ou Nexagan EC 40 à 1,5 l/ha dans 1 000 litres d'eau. Intervenez tôt le matin (rosée) pour que la bouillie descende au niveau du collet.

Surveillez votre pépinière pour intervenir si nécessaire contre altises ou pucerons.

DESHERBAGE

Si vous n'avez pas désherbé avant le semis, appliquez après celui-ci et avant la levée du chou :

Dacthal W 75	10 kg/ha
ou Propalane	8 kg/ha
ou Ramrod L	9,5 l/ha

TOMATES D'AUTOMNE NETTOYAGE DES SERRES

Ne pas "contreplanter" : si l'on constate dans la serre la présence importante de :
aleurodes
ou mineuses
ou acariens
ou botrytis
ou cladosporiose

La contreplantation n'est possible que lorsque la culture de printemps est en bon état sanitaire.

Serre : Un nettoyage sérieux avec suppression des mauvaises herbes et de tout déchet de culture est indispensable avant d'introduire les jeunes plants.

D'autre part :

- Dans le cas de contreplantation, effectuez un traitement de la culture de printemps et des structures et parois de la serre à l'Isathrine, la veille de la nouvelle plantation.

- Lorsqu'on procède d'abord à l'arrachage de l'ancienne culture, traitez cette dernière ainsi que les parois de la serre au Lannate ou à l'Isathrine, la veille de l'arrachage.

Pépinière :

. Pulvériser un insecticide sur les jeunes plants en pépinière pour qu'ils soient indemnes de pucerons.

. Avant la plantation, effectuez un traitement fongicide avec du Rovral.

TOUTES CULTURES DE SERRE

Attention aux maladies : Le Botrytis, la Cladosporiose... se développent dans certaines cultures, car le temps actuel leur est très favorable.

Les Avertissements Agricoles "Grandes cultures" (céréales, colza, maïs, pois, féveroles, prairies...) et "Pommes de terre" (primeur, semence, conservation) sont diffusés sur MINITEL par la Société EDIMATIC. Pour les consulter, composez le 36-15 (n° de Télétel) et tapez EDIMK (code du Service).
